

# **FRACTURA DE CALCANEOS BILATERAL TRATAMIENTO PERCUTANEO**

## **REPORTE DE UN CASO**

- ▶ GUSTAVO ADOLFO BACCA INSUASTY
- ▶ CAPITULO DE PIE Y TOBILLO
- ▶ SCCOT

# INDICACIONES

- ▶ FRACTURAS DE LA FACETA ARTICULAR POSTERIOR MAYORES DE 2 MM
- ▶ SANDERS II A Y II B (TAC)
- ▶ DISMINUCION DEL EDEMA PARA DISMINUIR RIESGO DE SINDROME COMPARTIMENTAL

# TECNICA QUIRURGICA

- ▶ Anestesia general
- ▶ Decúbito prono sin torniquete
- ▶ Abordaje posterior de calcáneo mínimo para inserción de clavo cónico previo brocado
- ▶ Reducción con técnica Essex Lopresti
- ▶ Uso de intensificador de imágenes
- ▶ Aplicación de tornillos cánulados autoroscantes de 6,5 mm si arandela
- ▶ Cierre de piel y vendaje bultoso



PIE IZQUIERDO Y DERECHO CLINICA LEON XIII MEDELLIN





# REHABILITACION

- ▶ MOVILIZACION PRECOZ DE DIGITOS, TOBILLO, RODILLA ACTIVOS Y PASIVOS
- ▶ PIES ELEVADOS HASTA DISMINUIR EL EDEMA
- ▶ SILLA DE RUEDAS INICIAL
- ▶ MARCHA EN EL AGUA ASISTIDO SEMANAS 8
- ▶ NO APOYO POR 12 SEMANAS CON RADIOGRAFIAS QUE INDIQUEN SIGNOS DE CONSOLIDACION (RARA LA NO UNION)